

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

MICROSER® Comprimidos 8 mg

Lea todo el folleto cuidadosamente antes de empezar a tomar este medicamento.

- Guarde este folleto. Quizás necesite leerlo nuevamente.
- Si usted tiene cualquier pregunta adicional, pregunte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado para usted. No la transfiera a otros. Les puede causar daño, incluso si sus síntomas son iguales a los suyos.
- Si cualquiera de los efectos secundarios se agrava, o si usted nota cualquier efecto secundario que no esté enumerado en este folleto, por favor informe a su médico o farmacéutico.

En este prospecto:

1. ¿Qué es Microser y para qué se usa?
2. Antes de tomar Microser
3. ¿Cómo se toma Microser?
4. Efectos secundarios posibles
5. ¿Cómo se almacena Microser?
6. Información adicional

1. ¿Qué es Microser y para qué se usa?

Composición:

Cada comprimido de Microser contiene:

Betahistina diclorhidrato 8 mg

Microser es un antivertiginoso que debe tomarse por vía oral.

Está indicado en desórdenes patológicos por déficit microcirculatorio en el laberinto: vértigo, síndrome de Menière y condiciones vertiginosas correlacionadas.

2. Antes de tomar Microser

No tome Microser si usted:

- Es alérgico a la betahistina o alguno de los ingredientes de la formulación (ver Sección 6.1.)
- Padece de presión sanguínea alta debido a un tumor adrenal (feocromocitoma).

Tenga especial cuidado e informe a su médico si usted:

- Padece de úlcera estomacal.
- Padece de asma.
- Está embarazada o planea estarlo.
- Está amamantando

Si usted está tomando otros medicamentos:

No se conocen interacciones de Microser con otros medicamentos. Si usted nota algún efecto no deseado, consulte a su médico.

Por favor informe a su médico si está tomando o ha tomado cualquier otro medicamento incluyendo aquellos obtenidos sin receta. Esto incluye los medicamentos naturales.

Tomando Microser con alimentos y bebidas:

Usted puede beber alcohol mientras está tomando Microser.
Usted puede tomar Microser con o sin alimentos.

Embarazo y lactancia:

No tome Microser si usted está embarazada a menos que su médico decida que esto es absolutamente necesario.

No amamante mientras esté usando Microser. No se conoce si Microser pasa a la leche materna.

Manejando vehículos y usando maquinaria:

Usted puede manejar y usar maquinaria durante el tratamiento con Microser siempre que no le de sueño. Asegúrese de determinar primero si este medicamento lo afecta antes de manejar o usar maquinaria.

3. ¿Cómo se toma Microser?**Como tomar Microser:**

Trague los comprimidos con agua.
Tome los comprimidos de preferencia con las comidas.

Cuánto Microser tomar:

Adultos:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis inicial usualmente recomendada es de 8 - 16 mg 3 veces al día, preferentemente con las comidas.

Las dosis de mantención generalmente están dentro del rango de 24 – 48 mg diarios.

Niños y Adolescentes:

No se recomienda el uso de Microser en niños y adolescentes, debido a que no hay datos suficientes en cuanto a seguridad y eficacia.

Si usted toma más Microser que el que debiera:

Si usted toma demasiado Microser (una sobredosis) llame a su médico o acuda a un centro asistencial. Lleve el envase al médico.

Si usted olvida tomar Microser:

Si usted olvida tomar un comprimido de Microser, espere hasta la dosis siguiente.

4. Efectos secundarios posibles

Al igual que con todos los medicamentos, Microser puede causar efectos secundarios (efectos o reacciones no deseadas), pero no todas las personas las presentan.

Los siguientes efectos adversos serios podrían presentarse durante el tratamiento con Microser:

- Reacciones alérgicas tales como: Hinchazón de la cara, labios, lengua o cuello. Esto puede ocasionar dificultad para respirar.
- Rash cutáneo de coloración roja, piel inflamada y picazón.

Si se presentan algunos de los efectos adversos antes mencionados, usted debe detener inmediatamente el tratamiento y contactar a su médico.

Efectos secundarios comunes (al menos 1 en 100 y menos de 1 en 10):

Náuseas, dolor de estómago.

Otros efectos adversos:

Dolor de cabeza, picazón, rash, ronchas, molestias gástricas leves tales como vómito, dolor de estómago e hinchazón. Tomar Microser con las comidas puede reducir cualquier problema estomacal.

5. ¿Cómo se almacena Microser?

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener en su envase original. Almacenar a no más de 30°C.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

6. Información adicional:

Qué contiene Microser:

El principio activo es Betahistina didorhidrato.

Los otros componentes son: celulosa microcristalina, manitol, dióxido de silicio, talco, ácido cítrico anhidro.

Cuál es el aspecto de Microser:

Los comprimidos de Microser 8 mg son, redondos, aplanados, de color blanco a blanco crema, grabados por una cara con el logotipo μ 1.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA